

Vente des pesticides

Vente en gros (classes 1 à 5)

et au détail (classes 1 à 3)

ERRATA ET SECTIONS FACULTATIVES – 1^{ère} ÉDITION

CORRIGÉ DES EXERCICES

pour les éditions parues avant mars 2009

The logo for Sofad, consisting of the word "sofad" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid red square.

sofad

CHAPITRE 1

Exercice 1.2

- 1- Groupe chimique : d
- 2- Groupe chimique : c
- 3- Groupe chimique : e
- 4- Groupe chimique : a
- 5- Groupe chimique : b

CHAPITRE 3

Exercice 3.1

a)

$$\text{Solution n° 1 : } c = \frac{m}{V} = \frac{3 \text{ g}}{1 \text{ L}} = 3 \text{ g/L}$$

b)

$$\text{Solution n° 2 : } c = \frac{m}{V} = \frac{5 \text{ g}}{0,5 \text{ L}} = 10 \text{ g/L}$$

c)

$$\text{Solution n° 3 : } c = \frac{m}{V} = \frac{8 \text{ g}}{4 \text{ L}} = 2 \text{ g/L}$$

d)

$$\text{Solution n° 4 : } c = \frac{m}{V} = \frac{7 \text{ g}}{3 \text{ L}} = 2,33 \text{ g/L}$$

- e) La solution dont la concentration en sucre est la plus grande est la solution n° 2.
- f) La solution dont la concentration en sucre est la moins grande est la solution n° 3.
- g) Solutions n° 3, 4, 1 et 2.

Exercice 3.2

$$\text{Solution n° 1: } c = \frac{m}{V} = \frac{3 \text{ g}}{1 \text{ L}} = 3 \text{ g/L}$$

$$\text{Solution n° 2: } c = \frac{m}{V} = \frac{6 \text{ g}}{3 \text{ L}} = 2 \text{ g/L}$$

$$\text{Solution n° 3: } c = \frac{m}{V} = \frac{27 \text{ g}}{9 \text{ L}} = 3 \text{ g/L}$$

$$\text{Solution n° 4: } c = \frac{m}{V} = \frac{14 \text{ g}}{2 \text{ L}} = 7 \text{ g/L}$$

$$\text{Solution n° 5: } c = \frac{m}{V} = \frac{5 \text{ g}}{0,5 \text{ L}} = 10 \text{ g/L}$$

$$\text{Solution n° 6: } c = \frac{m}{V} = \frac{10 \text{ g}}{1 \text{ L}} = 10 \text{ g/L}$$

Les solutions classées selon un ordre croissant de concentration se présentent comme suit : Solution n° 2, Solutions n° 1 et 3, Solution n° 4, Solutions n° 5 et 6.

Exercice 3.3

a) Solution A : $m = 3 \text{ g}$ et $V = 300 \text{ ml} = ? \text{ L}$

$$1 \text{ L} = 1\,000 \text{ ml}$$

$$? \text{ L} = 300 \text{ ml}$$

$$? \text{ L} = \frac{1 \text{ L} \times 300 \text{ ml}}{1\,000 \text{ ml}} = 0,3 \text{ L}$$

$$\text{Concentration: } c = \frac{m}{V} = \frac{3 \text{ g}}{0,3 \text{ L}} = 10 \text{ g/L}$$

b) Solution B : $m = 2 \text{ g}$ et $V = 800 \text{ ml} = ? \text{ L}$

$$1 \text{ L} = 1\,000 \text{ ml}$$

$$? \text{ L} = 800 \text{ ml}$$

$$? \text{ L} = \frac{1 \text{ L} \times 800 \text{ ml}}{1\,000 \text{ ml}} = 0,8 \text{ L}$$

$$\text{Concentration: } c = \frac{m}{V} = \frac{2 \text{ g}}{0,8 \text{ L}} = 2,5 \text{ g/L}$$

c) Solution C : $m = 0,05 \text{ kg} = ? \text{ g}$ et $V = 10 \text{ L}$

$$1000 \text{ g} = 1 \text{ kg}$$

$$? \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$$




$$? \text{ L} = \frac{0,05 \text{ kg} \times 1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} = 50 \text{ g}$$

$$\text{Concentration : } c = \frac{m}{V} = \frac{50 \text{ g}}{10 \text{ L}} = 5 \text{ g/L}$$






d) La solution A : 10 g/L.

e) La solution B : 2,5 g/L.

EXERCICE 7.6

PHOTOS	NOM DE LA MAUVAISE HERBE	MONOCOTYLÉDONES OU DICOTYLÉDONES?	CYCLE DE VIE (ANNUELLE, BISANUELLE OU VIVACE)?
	Exemple 1 Amarante à racine rouge	dicotylédones	annuelle
	Exemple 2 Carotte sauvage	dicotylédones	bisannuelle
	Chiendent	monocotylédones	vivace

Vente des pesticides – Vente en gros et au détail

PHOTOS	NOM DE LA MAUVAISE HERBE	MONOCOTYLÉDONES OU DICOTYLÉDONES?	CYCLE DE VIE (ANNUELLE, BISANUELLE OU VIVACE)?
	Échinochloa pied-de-coq	monocotylédones	annuelle
	Vesce jargeau	dicotylédones	vivace
	Digitaire astringeante	monocotylédones	annuelle
	Plantain majeur	dicotylédones	vivace
	Petite herbe à poux	dicotylédones	annuelle

Vente des pesticides – Vente en gros et au détail

PHOTOS	NOM DE LA MAUVAISE HERBE	MONOCOTYLÉDONES OU DICOTYLÉDONES?	CYCLE DE VIE (ANNUELLE, BISANUELLE OU VIVACE)?
	Moutarde des champs	dicotylédones	annuelle
	Chénopode blanc	dicotylédones	annuelle
	Petite bardane	dicotylédones	bisannuelle
	Sétaire verte	monocotylédones	annuelle
	Folle avoine	monocotylédones	annuelle

EXERCICE 7.10

1. Non, car le seuil d'intervention est de 12 punaises par 100 hampes florales dépistées (0,12 punaise par hampe florale.)
2. Oui, car le seuil d'intervention est de 12 punaises par 100 plants dépistés.

Comme nous sommes en début de floraison, nous choisirons l'Endosulfan, car c'est le produit le moins toxique pour les abeilles qui assurent la pollinisation. Le délai avant la récolte est de 7 jours. 2,00 kg d'Endosulfan® 50 W seront nécessaires par hectare.

EXERCICE 7.16

La méthode la plus efficace est l'exclusion. Par contre, il n'est pas possible d'empêcher le raton laveur de venir dans un champ. On doit donc privilégier la capture vivante à l'aide d'une cage.

EXERCICES D'ENRICHISSEMENT EN MATHÉMATIQUE

Calcul de la superficie (aire ou surface) d'une étendue

- a) $25 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 300 \text{ m}^2$
- b) $5 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 3,14 = 78,5 \text{ m}^2$

Règle de trois

$(5 \text{ ha} \times 130 \text{ L}) \div 1 \text{ ha} = 650 \text{ L}$ de pesticides pour 5 hectares de terrain

Calcul du volume (l'espace occupé par un objet, un édifice ou un bâtiment)

- a) $45,5 \text{ m} \times 10 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 4\,050 \text{ m}^3$
- b) $(4 \times 2 \text{ m}) \div 3 = 2,67 \text{ m}^3$
- c) $3,2 \text{ m} \times 55,3 \text{ m} = 176,96 \text{ m}^3$
 $(78,5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) \div 2 = 785 \text{ m}^3$